

โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนองโพ

หลักการดูแลสัตว์หลังการเข้าเฟือก

การเข้าเฟือกเป็นการรักษาสัตว์ในกรณีของกระดุกร้าวหรือกระดุกหักในบางชนิดเท่านั้น ไม่สามารถรักษากระดุกหักได้ทุกชนิด บางครั้งใช้ในกรณีข้อเคลื่อน ข้อสำคัญของการเข้าเฟือกก็คือ ต้องเข้าเฟือกให้ “พอดี” ถ้าหลวมไปเฟือกจะหลุดไม่ได้ผล ถ้าแน่นเกินไปจะทำให้ปลายเท้าขาดเลือดอาจทำให้ขาเน่าได้

การดูแลต่างๆ ไป

1. พยายามให้สัตว์คงใช้ขาที่เข้าเฟือกไว้ให้มากที่สุด เช่น ขังกรง
2. สังเกตตำแหน่งของเฟือกว่าเคลื่อนหรือไม่ ปลายเท้าบวมหรือไม่ ถ้าผิดปกติไปให้รีบพาลกลับมาโดยด่วน
3. การเข้าเฟือกอาจจะเกิดบาดแผลขึ้นได้ตามของเฟือกหรือปุ่มกระดูกภายในเฟือก โดยจะรู้ได้จากกลิ่นที่เกิดขึ้น ถ้ากลิ่นเหม็นแสดงว่ามีแผลต้องรีบพามาตรวจ
4. ระวังอย่าให้สัตว์กัดเฟือกหรือทำให้เฟือกเปียกน้ำ เพราะจะทำให้ผิวหนังด้านในเฟือกเกิดการอักเสบและเน่าได้
5. กินแคลเซียมเสริมวันละ.....เม็ด
6. ควรขังกรงไว้ประมาณ.....เดือน
7. นัดดูอาการวันที่.....
เพื่อ () X-ray () ตรวจเฟือก
8. เจ้าของสัตว์ควรมาตรวจตามนัดเสมอ

สัตว์ชื่อ.....OPD.NO.....

ลงชื่อ.....สัตวแพทย์เวร

โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนองโพ

หลักการดูแลสัตว์หลังการเข้าเฟือก

การเข้าเฟือกเป็นการรักษาสัตว์ในกรณีของกระดุกร้าวหรือกระดุกหักในบางชนิดเท่านั้น ไม่สามารถรักษากระดุกหักได้ทุกชนิด บางครั้งใช้ในกรณีข้อเคลื่อน ข้อสำคัญของการเข้าเฟือกก็คือ ต้องเข้าเฟือกให้ “พอดี” ถ้าหลวมไปเฟือกจะหลุดไม่ได้ผล ถ้าแน่นเกินไปจะทำให้ปลายเท้าขาดเลือดอาจทำให้ขาเน่าได้

การดูแลต่างๆ ไป

1. พยายามให้สัตว์คงใช้ขาที่เข้าเฟือกไว้ให้มากที่สุด เช่น ขังกรง
2. สังเกตตำแหน่งของเฟือกว่าเคลื่อนหรือไม่ ปลายเท้าบวมหรือไม่ ถ้าผิดปกติไปให้รีบพาลกลับมาโดยด่วน
3. การเข้าเฟือกอาจจะเกิดบาดแผลขึ้นได้ตามของเฟือกหรือปุ่มกระดูกภายในเฟือก โดยจะรู้ได้จากกลิ่นที่เกิดขึ้น ถ้ากลิ่นเหม็นแสดงว่ามีแผลต้องรีบพามาตรวจ
4. ระวังอย่าให้สัตว์กัดเฟือกหรือทำให้เฟือกเปียกน้ำ เพราะจะทำให้ผิวหนังด้านในเฟือกเกิดการอักเสบและเน่าได้
5. กินแคลเซียมเสริมวันละ.....เม็ด
6. ควรขังกรงไว้ประมาณ.....เดือน
7. นัดดูอาการวันที่.....
เพื่อ () X-ray () ตรวจเฟือก
8. เจ้าของสัตว์ควรมาตรวจตามนัดเสมอ

สัตว์ชื่อ.....OPD.NO.....

ลงชื่อ.....สัตวแพทย์เวร

โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนองโพ

หลักการดูแลสัตว์หลังการเข้าเฟือก

การเข้าเฟือกเป็นการรักษาสัตว์ในกรณีของกระดุกร้าวหรือกระดุกหักในบางชนิดเท่านั้น ไม่สามารถรักษากระดุกหักได้ทุกชนิด บางครั้งใช้ในกรณีข้อเคลื่อน ข้อสำคัญของการเข้าเฟือกก็คือ ต้องเข้าเฟือกให้ “พอดี” ถ้าหลวมไปเฟือกจะหลุดไม่ได้ผล ถ้าแน่นเกินไปจะทำให้ปลายเท้าขาดเลือดอาจทำให้ขาเน่าได้

การดูแลต่างๆ ไป

1. พยายามให้สัตว์คงใช้ขาที่เข้าเฟือกไว้ให้มากที่สุด เช่น ขังกรง
2. สังเกตตำแหน่งของเฟือกว่าเคลื่อนหรือไม่ ปลายเท้าบวมหรือไม่ ถ้าผิดปกติไปให้รีบพาลกลับมาโดยด่วน
3. การเข้าเฟือกอาจจะเกิดบาดแผลขึ้นได้ตามของเฟือกหรือปุ่มกระดูกภายในเฟือก โดยจะรู้ได้จากกลิ่นที่เกิดขึ้น ถ้ากลิ่นเหม็นแสดงว่ามีแผลต้องรีบพามาตรวจ
4. ระวังอย่าให้สัตว์กัดเฟือกหรือทำให้เฟือกเปียกน้ำ เพราะจะทำให้ผิวหนังด้านในเฟือกเกิดการอักเสบและเน่าได้
5. กินแคลเซียมเสริมวันละ.....เม็ด
6. ควรขังกรงไว้ประมาณ.....เดือน
7. นัดดูอาการวันที่.....
เพื่อ () X-ray () ตรวจเฟือก
8. เจ้าของสัตว์ควรมาตรวจตามนัดเสมอ

สัตว์ชื่อ.....OPD.NO.....

ลงชื่อ.....สัตวแพทย์เวร